What is Parodontax Extra Mouthwash for?

The active ingredient is chlorhexidine digluconate which is an antibacterial agent that reduces the formation of dental plaque and is used to:

- Helps prevent gum disease (where gums may bleed when brushed)
- Helps promote gum health after dental surgery
- Helps to manage recurring mouth ulcers
- Aid to maintain mouth hygiene
- Aid to manage oral thrush and denture sore mouth.

Keep out of the reach and sight of children.
Store below 25°C.

Manufactured by Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Germany for Haleon UK Trading Limited, UK.

mysterycare@haleon.com
mysterycare@haleon.com
800444/0912 • Saudi Arabia
+971 156506404 • Other countries

Expiry:
Batch No:
Manufactured:

الانتهاء:
رقم التشغيلة:
تصنيع:

صنع في ألمانيا
Made in Germany

ما هي استعمالات غسول الفم باروودونتكس إكسترا؟

المادة الفعالة هي جلوكونات الكلوركسيدين وهو مضاد للبكتيريا الذي يقضي على تكوين طلاء الأسنان ويستعمل في:

- يساعد على الوقاية من أمراض اللثة (حيث قد تنزف اللثة عند تمشيط الأسنان بالفرشاة)
- يساعد على تحسين صحة اللثة عقب عمليات جراحة الأسنان
- يساعد على الحد من تقرحات الفم المتكررة
- يساعد على المحافظة على صحة الفم
- يساعد على التحكم بمشكل طفيليات الفم والتهاب الفم بسبب طقم الأسنان.

يحفظ بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.
يخزن في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.
صنع بواسطة أوميغا فارما للتصنيع ذ.م.م وكو. كي جي، ألمانيا لصالح شركة هاليون م.ح.ت المحدودة، المملكة المتحدة.

Possible side effects

This mouthwash can have side effects, but not everybody gets them.

- Stop using Parodontax Extra Mouthwash and seek immediate medical help if you get a rash, swelling of the lips, tongue, throat or neck, or have difficulty breathing or any symptoms of a severe allergic reaction.
  Anaphylaxis as well as severe allergic reactions have been reported during post-marketing use with dental products containing Chlorhexidine.
- Stop using Parodontax Extra Mouthwash and tell your dentist if you get soreness or irritation of the mouth.
- Temporary staining of the teeth and tongue may occur. The stain is not permanent and can largely be prevented by reducing the consumption of foodstuffs that may stain such as tea and coffee. The staining may be controlled with brushing but in some cases professional cleaning may be necessary.
- You may notice a change of taste, tingling or burning sensation when you first use Parodontax Extra Mouthwash. This usually goes away with continued use. However if it continues then speak to a healthcare professional.
- Isolated reports of rash, swelling of the lips, tongue, throat, or face, or difficulty breathing have been received. These may be symptoms of a severe allergic reaction.

Other reactions include coated tongue, dry mouth and burning of the mouth. Isolated reports of discoloration of the teeth and tongue, swelling within the mouth, pain in the cheek glands and peeling of the lining of the mouth have also been received.

Active Ingredient: 0.2% (w/v) Chlorhexidine Digluconate
Ingredients: Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Chlorhexidine Digluconate

Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.

Check before you use

Do not use:

- if you have ever had an allergic reaction to chlorhexidine digluconate or any of the other ingredients.
- For children under 12, check with a healthcare professional before use.
- Anywhere other than in your mouth. Wash thoroughly if you get any in your eyes or ears. For external use only. Keep out of eyes and ears.
- Immediately after brushing your teeth. See How to use for more information.

Take special care with Parodontax Extra

- Do not bleach fabrics that have been in contact with the mouthwash.
- There is no evidence of any adverse effects of Parodontax Extra on the unborn child or on infants during breast feeding.

How to use

- Use only if seal on cap is present and intact before opening.
- Do not swallow.
- Do not exceed the stated dose.
- Some toothpastes can stop Parodontax Extra Mouthwash working. Rinse your mouth thoroughly with water and wait 5 minutes after brushing your teeth before using Parodontax Extra Mouthwash. You can also use Parodontax Extra Mouthwash at a different time of day.
- Use twice a day. Fill the cap to 10 ml line. Rinse mouth for 15 minutes. Do not dilute.
- Denture sore mouth: Clean & soak your dentures in the mouthwash for 15 minutes twice a day.

If your symptoms persist, see your dentist.

تأكد جيدا قبل أن تستعمل

لا تأخذ إذا كنت حساسيا من قبل تجاه:

- الكلوركسيدين أو أي من المكونات الأخرى.
- للأطفال تحت سن ١٢ سنة، يرجى الاستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستخدام.
- في أي مكان غير الفم. استخدم الماء الكثير إذا أصبح في العينين أو الأذنين. للاستخدام الخارجي فقط. ابعد عن العينين والأذنين.
- بعد تنظيف أسنانك مباشرة. انظر قسم كيفية الاستعمال للمعلومات الإضافية.

كن حذرا عند الاستعمال باروودونتكس إكسترا

- لا تقم بتبييض الأقمشة التي تم تعرضت لغسول الفم.
- ليس هناك دليل على وجود تأثيرات ضارة لباروودونتكس إكسترا على الجنين أو الرضع أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيفية الاستعمال

- يستعمل فقط إذا كان غطاء الغسول موجود وسليم قبل الفتح.
- لا تبلع المحلول.
- لا تتجاوز الجرعة المحددة.
- بعض معاجين الأسنان يمكن أن يمنع عمل غسول الفم باروودونتكس إكسترا. لتجنب هذا، اشطف فمك جيدا بالماء وانتظر ٥ دقائق بعد تنظيف أسنانك قبل استخدام غسول الفم باروودونتكس إكسترا. يمكنك أيضا استخدام غسول الفم باروودونتكس إكسترا في وقت مختلف عن يوم آخر.
- استعمل مرتين في اليوم. املأ الغطاء حتى خط ١٠ مل. استخدم الغسول لمدة ١٥ دقيقة. لا تخفف.
- التهاب اللثة بسبب طقم الأسنان: نظف وانقع طقم الأسنان في غسول الفم لمدة ١٥ دقيقة مرتين في اليوم.

إذا استمرت الأعراض، راجع طبيب الأسنان.

الآثار الجانبية المحتملة

يمكن أن تسبب غسول الفم آثار جانبية، لكن ليس الجميع.

- توقف عن استخدام غسول الفم باروودونتكس إكسترا والتمس المساعدة الطبية فورا إذا كنت تعاني من طفح جلدي أو تورم للشفاه أو اللسان أو الحلق أو الرقبة أو إذا واجهت صعوبة بالتنفس.
  تم الإبلاغ عن حالات فرط التحسس والأزمة التحسسية الشديدة أثناء الاستخدام بعد تسويق المنتج عند استخدامه مع منتجات عناية بالأسنان تحتوي على مادة الكلوركسيدين.
- توقف عن استخدام غسول الفم باروودونتكس إكسترا وأخبر طبيب الأسنان إذا شعرت بالألم أو التهيج في الفم.
- قد يحدث تلون مؤقت للأسنان واللسان. هذا التلون غير دائم، كما يمكن منعه جزئيا عبر تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التي من الممكن أن تسبب تلون الأسنان مثل الشاي والقهوة. يمكن السيطرة على تلون الأسنان عن طريق غسل الأسنان، ولكن في بعض الحالات، يكون التنظيف المحترف ضروري.
- قد تلاحظ تغير في الطعم أو وخز أو حرقة عند استخدامك لغسول الفم باروودونتكس إكسترا لأول مرة. عادة ما يختفي ذلك مع الاستخدام المستمر.
  في حالة استمرار الأعراض، راجع أخصائي الصيدلية.
- تم الإبلاغ عن بعض الحالات الفردية من الطفح الجلدي أو تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق أو الوجه أو صعوبة صعوبة في التنفس. يمكن أن تكون هذه الحالات أعراض لتفاعلات حساسية شديدة. يوجد بعض الحالات الأخرى التي تشمل اللسان المغطى، جفاف الفم والحرقة، وتقشر الجزء من الفم. بعض الحالات الفردية من تغير لون الأسنان واللسان، حدوث تورم في الفم، وتقشر الجلد الميت، وتقشر في بطانة الفم.

المكون الفعال: ٠,٢٪ (w/v) من جلوكونات الكلوركسيدين

العلامات التجارية ممنوحة لصالح أو مملوكة لشركات هاليون.